

ANTIRETROVIRAUX

« Long acting »

Retour d'expérience


Service de Maladies Infectieuses
CHR ORLEANS

DESCRIPTION DE LA POPULATION

Population


- File active injectée : 178
- Traitement en cours : 155
- Arrêt de traitement: 14
- Programmation en attente : 9

Répartition par sexe




DESCRIPTION DE LA POPULATION

Répartition par âge



Traitement ARV avant 1^{ère} injection




Médicaments	Pourcentage
Odefsey	24%
Biktarvy	20%
Juluca	17%
Dovato	11%
Triumeq	6%
Truvada	5%
Eviplera	5%
Genvoya	3%
Atripla	1%
Biktarvy + Edurant	1%
Epivir + Tivicay	1%
Delstrigo	1%
Edurant + Cabotégravir	1%
Juluca + Viread	1%
Odefsey+Tivicay	1%
Prezista + Edurant + Norvir	1%
Reyataz + Truvada	1%
Reyataz + Truvada + Norvir	1%
Tivicay	1%
Truvada + Reyataz	1%
Truvada + Viramune	1%
Somme	100%

Eligibilité aux ARV Injectables

- Charge virale < 50 copies/mL (sous traitement antirétroviral stable depuis au moins 6 mois)
- Supérieur à 200 CD4/mm³
- Sans preuve de résistance actuelle ou antérieure et sans antécédent d'échec virologique aux agents de la classe des INNTI et des INI


Paramètres virologiques à M1 post-injection (132 patients)

• CV (< 20 cp/ml)




■ <20 ■ 21-50 ■ >50

• CD4 (/mm³)




■ [50-200] ■ [200-350] ■ [350-500] ■ > ou = 500 ■ non fait


- Indétectabilité de la CV en fonction du sous-type à M1




Evolution du Poids



Dosage résiduel Rilpi/Cabo_ M1 post-injection sur 120 patients



Dosage résiduel Rilpi/Cabo_ M12 post-injection sur 33 patients



Arrêts Thérapeutiques

Motifs	Population	Commentaires
Décision du patient	6	<ul style="list-style-type: none">- Contrainte des venues sur site;- Déménagement ;- Contrainte professionnelle
Douleurs	2	Au site d'injection à droite (Rilpi)
Echec Virologique	2	<ul style="list-style-type: none">- 1^{er} cas : contrôle virologique imparfait CV détectable (peut-être mauvais contrôle à une hémopathie sous-jacente connue2^{ème} cas : Echec virologique avec résistance Q148 non connue à l'initiation du traitement
Effets secondaires Neurologiques	3	<ul style="list-style-type: none">- Céphalées- Etourdissement
Non observance	1	Non respect des RDV