


Dépistage des comorbidités

Recommandations de prise en charge du VIH :
Rapport d'experts 2024



Parcours

- * Suivi infectieux annuel avec réévaluation du traitement (renouvellement possible via **Omnidoc**)
- * Orientation vers infectiologue si difficulté
- * Possibilité de présenter des cas complexes en **Réunion de Concertation Professionnelle (RCP)** au CHRU de Tours (rcp-vih@chu-tours.fr) et d'Orléans (maladies.infectieuses@chu-orleans.fr)
- * Education Thérapeutique du Patient (ETP)
- * Associations de patients : AIDES

Plus d'informations

vihclic.fr
www.hiv-druginteractions.org
<https://app.omnidoc.fr/group/3acb50b8-14ea-476e-9c8a-4c26c1217d9c> (CHU de Tours)

Documents complémentaires sur le site du CoReSS



CoReSS Centre-Val de Loire
2 boulevard Tonnellé 37000 TOURS
coress@chu-tours.fr

SUIVI DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH) EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Actualisation des recommandations 2024



CoReSS
CENTRE VAL DE LOIRE
La santé sexuelle dans votre région

Points d'attention en consultation



Suivi clinique

- * Examen clinique orienté selon la demande en consultation et comorbidités connues
- * Vigilance sur l'examen cutané
- * Examen gynécologique
- * Examen buccal et aires ganglionnaires

Suivi biologique

Tous les 6 à 12 mois

- * Charge virale (CV)
- * CD4 (tous les 2 ans si > 500/mm³)
- * NFS plaquettes
- * Créatininémie avec estimation du DFG (CKD-EPI)
- * Rapport albuminurie/créatininurie sur échantillon
- * Cholestérol (tous les 5 ans si normal et absence de facteurs de risques cardiovasculaires)
- * Glycémie (après 45 ans, tous les 3-5 ans si normal et absence de facteurs de risques cardiovasculaires)
- * Dépistage IST et coinfections

Traitement

- * Attention aux interactions médicamenteuses
- * Suivi de l'observance et de la tolérance
- * Une PVVIH avec une charge virale indétectable grâce à son traitement **ne transmet pas le VIH**

Santé sexuelle

- * Vigilance chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes consommant des drogues pendant les rapports (chemsex)
- * Suivi contraceptif des femmes
- * Désir de grossesse : anticiper et accompagner

Risques de comorbidités

Le VIH est un facteur de risque pour plusieurs pathologies, qu'il faut dépister et prévenir :

- * Evaluation du bien-être physique et psychique, vécu de la maladie, santé mentale
-
- * Dépistage des cancers vulvaires et du col de l'utérus chez les femmes
-
- * Dépistage des cancers anaux chez les femmes avec antécédents de lésions HPV et les HSH
-
- * Suivi cardiologique (à partir de 40 ans ♂ ou 50 ans ♀ en l'absence d'autres facteurs de risque)
-
- * **Sevrage tabagique**, alcool, addictions, chemsex
-
- * Règles hygiéno-diététiques : exercice physique, consultation diététique, contrôle du poids
-
- * Prise en soins des autres facteurs de risque identifiés (diabète, hypertension artérielle, ...)



La vaccination

La réponse immunitaire des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est moins bonne qu'en population générale. Il faut mettre à jour plus régulièrement les vaccins, de même pour l'entourage.

Recommandations vaccinales

chez les PVVIH avec CV contrôlée :

Vaccin	Profil	Schéma
BCG	Contre-indiqué	
COVID-19	Tous	Annuel
dTPcoq	Tous	1 dose puis /10 ans
Fièvre jaune	Voyage en zone d'endémie et CD4 > 200/mm ³	2 doses (0, 10 ans)
Grippe	Tous	Annuel
Hépatite A	HSH, co-infection VHC/VHB, voyage en zone d'endémie, hépatopathie, mucoviscidose	2 doses (0, 6 mois) +/- 3ème dose si titre anticorps non protecteur
Hépatite B	Tous	4 <u> doubles </u> doses (0, 1, 2, 6 mois)
HPV	Moins de 26 ans	3 doses (0, 2, 6 mois)
Méningocoque ACYW	Tous	1 dose
Méningocoque B	Tous	2 à 3 doses selon le vaccin utilisé
Mpox	HSH ou multipartenaires, • CD4 < 200/mm ³ • CD4 > 200/mm ³	Schéma selon CD4 : • 3 doses (0, 1, 2 mois) puis rappel à 2 ans • 2 doses (0,1 mois) puis rappel à 2 ans
Pneumocoque	Tous	1 dose de Prevenar®20 ou 21
ROR	CD4 > 200/mm ³	2 doses (0, 2 mois)
Varicelle (si séro négative)	CD4 > 200/mm ³	2 doses (0, 2 mois)
Zona <u>non vivant</u>	CD4 < 200/mm ³ ou à partir de 65 ans	2 doses (0, 2 mois)
VRS	Tous à partir de 75 ans Pathologies respiratoires et/ou cardiaque chronique à partir de 65 ans	1 dose

